

DICLAZURILO 0,5%

Diclazurilo 0,5%

Antiparasitarios – Polvo Oral

Reg. SAG N° 1771

COMPOSICIÓN

Cada 100 g contiene:

Diclazurilo	0,5 g
Excipiente c.s.p.	100 g



Antiparasitarios

ESPECIES DE DESTINO

Aves (Pollos broiler y Pavos).

INDICACIONES

Para el control de la coccidiosis en las aves.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

200 g/tonelada de alimento, lo que equivale a una concentración de 1 ppm del principio activo.

Pollos broiler y pavos: 130 a 160 µg de Diclazurilo/kg de peso vivo las primeras 3 semanas de edad (equivalente a 26 - 32 mg de Diclazurilo 0.5% por kg de peso vivo).

Posteriormente administrar 70 a 120 µg de Diclazurilo/kg de peso vivo, desde la 4a a la 7ª semana de edad.

En pavos, Diclazurilo 0.5% debe administrarse hasta las 12 semanas de edad.

Vía de administración: Vía oral, en el alimento.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERÍODO DE RESGUARDO

Cero días.

No administrar en gallinas de postura.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Bolsas de 20 kg.

FT0050NAC13032020R1V2

