

AMPLIFORT®

Ampicilina 75 mg / Cloxacilina 200 mg

Antibióticos – Suspensión Intramamaria

REG. SAG N° 0736 - B

COMPOSICIÓN

Cada jeringa (1 dosis) contiene:

| | |
|---|-----------|
| Ampicilina sódica (Equivalente a 75 mg Ampicilina base) | 80 mg |
| Cloxacilina sódica (Equivalente a 200 mg Cloxacilina base) | 210 mg |
| Excipientes c.s.p. | 1 jeringa |



ESPECIES DE DESTINO

Bovinos (vacas lecheras).

INDICACIONES DE USO

Terapia clínica de las mastitis bacterianas producidas en bovinos por gérmenes sensibles a la Ampicilina y Cloxacilina, tales como:

- Bacterias Gram (+): *Staphylococcus aureus* (incluso cepas penicilina-resistentes), *Streptococcus* spp. (incluso enterococos), *Corynebacterium pyogenes*, *Clostridium perfringens*, *Cl. pseudotuberculosis*, *Listeria monocytogenes* y *Bacillus anthracis*.
- Bacterias Gram (-): *Haemophilus influenza*, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Proteus mirabilis*, *P. morganii*, *Brucella* spp., *Neisseria* spp, y *Bordetella pertussis*.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

Bovinos: 75 mg de Ampicilina + 200 mg de Cloxacilina por cuarto (equivalente a 1 jeringa por cuarto) cada 12 horas. El tratamiento completo incluye 3 dosis.

Vía de administración: Intramamaria.

Modo de empleo:

- Ordeñar a fondo.
- Lavar y desinfectar la ubre.
- Administrar en forma aséptica.
- Efectuar un suave masaje de la ubre para favorecer la distribución de la suspensión.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

Los animales deben ser tratados al detectarse los primeros signos de mastitis, siempre durante el periodo de lactación.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar animales con historias de hipersensibilidad a las penicilinas.
- Animales con historial conocido de alergia a las Cefalosporinas deben ser tratados con especial atención.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

En muy raras ocasiones (< 1 animal por cada 10.000 animales tratados, incluidos informes aislados) pueden producirse reacciones alérgicas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: menos de 30°C y al abrigo de la luz. No refrigerar ni congelar.

PERIODO DE RESGUARDO

- Carne: 7 días.
- Leche: 60 horas.

PRESENTACIONES

Caja con 4 o 12 jeringas de 8 g y Balde con 48 jeringas de 8 g.

USO VETERINARIO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

FT0142NAC28022024R2V1

