



APIVAR®

Amitraz 500 mg
Antiparasitarios – Tiras

REG. SAG N° 2578

COMPOSICIÓN

Cada tira (15 g) contiene:

Amitraz	500 mg
Excipientes c.s.p.	15 g

ESPECIES DE DESTINO

Abejas melíferas (*Apis mellifera*).

INDICACIONES DE USO

Tratamiento y prevención de la parasitosis externa causada por *Varroa destructor*.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

Usar dos tiras por cuerpo de colmena durante 6 semanas (si la cantidad de cría es baja o si se espera producción de miel pronto) o 10 semanas (si hay cría presente y no hay producción de miel).

Vía de administración:

Uso en colmenas.

MODO DE EMPLEO

Separe la doble tira y coloque cada tira entre dos cuadros en la zona de cría o en el racimo de abejas con una distancia mínima de dos cuadros entre ambas tiras.

Las tiras deben colocarse de la forma más simétrica posible en el interior del área de cría o racimo de abejas, evitando los bordes de la zona. Utilice la tira troquelada como un colgante y empuje suavemente la tira entre los cuadros de modo que el extremo de la tira no sobresalga de la superficie de los cuadros.

Alternativamente, las tiras se pueden colgar por el agujero con un pequeño diente fijo en el marco.

Si la cantidad de cría es baja durante el curso del tratamiento o si se espera una producción de miel pronto, las tiras pueden ser retiradas después de 6 semanas de tratamiento.

Si la cría está presente y no hay producción de miel, dejar las tiras puestas durante 10 semanas y retirarlas al final del tratamiento. En caso de que las tiras estén cubiertas por propóleos y/o cera, a mitad del tratamiento, se recomienda raspar las tiras usando una herramienta adecuada.

A continuación, las tiras deben colocarse suavemente de nuevo en la colmena, y si es necesario, volver a hacerlo siguiendo las instrucciones de aplicación anteriores (en caso de cambios en el racimo de abejas o área de cría).

El momento recomendado para aplicar el tratamiento es cuando las alzas de miel son retiradas después de la cosecha y antes de que la actividad de producción de miel comience.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

No exceda la dosis y la duración recomendadas de uso.

No aplique una dosis inferior a la recomendada.

No corte las tiras.

Tratar todas las colonias de un apiario de manera simultánea.

Retire las tiras al final del tratamiento.

No reutilice las tiras.

Un uso inapropiado del producto podría suponer un mayor riesgo de desarrollo de resistencia y en última instancia podría suponer una terapia ineficaz.

Una vez abierto el producto, utilizar inmediatamente y descartar el producto sobrante.



Antiparasitarios – Tiras

Fabricado por:
VETO-PHARMA SAS.
ZA Champrue, 36310 Chaillac, Francia.

Importado y distribuido por:
Centrovet Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: ventas@virbac.cl; www.virbac.cl

Bajo licencia de VETO-PHARMA SAS.
12-14 rue de la Croix Martre.
91120 Palaiseau, Francia.



APIVAR[®]

Amitraz 500 mg
Antiparasitarios – Tiras

CONTRAINDICACIONES

No utilizar durante la producción de miel a menos que sea necesario para la supervivencia de la colonia.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: a no más de 25 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar. No refrigerar ni congelar.

PERIODO DE RESGUARDO

Miel: 0 (cero) días.

Retirar las alzas melarias antes de aplicar el producto.

No usar durante el periodo de recolección de las abejas.

PRESENTACIONES

Sobres con 4, 10 o 60 tiras de 15 g cada una.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

Antiparasitarios – Tiras

FT0203NAC28072023R1V1

Fabricado por:
VETO-PHARMA SAS.
ZA Champrue, 36310 Chaillac, Francia.

Importado y distribuido por:
Centrovet Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos – Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: ventas@virbac.cl; www.virbac.cl

Bajo licencia de VETO-PHARMA SAS.
12-14 rue de la Croix Martre.
91120 Palaiseau, Francia.