

BLUEGUARD® IPN INYECTABLE

Vacuna inactivada contra necrosis pancreática infecciosa

Vacunas – Emulsión Inyectable

Registro Provisional SAG N° 1854 - BP

COMPOSICIÓN

Cada dosis de vacuna (0,1 mL) contiene:

Virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa, Cepa Sp221A1a, Serotipo Sp $10^{7,0} - 10^{7,5}$ TCID₅₀
Virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa, Cepa Sp221Thr, Serotipo Sp $10^{7,0} - 10^{7,5}$ TCID₅₀
Excipientes c.s.p. 0,1 mL

Inactivante: Formaldehído.

Adyuvantes: Adyuvante oleoso no mineral

PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Para estimular la inmunidad activa contra el virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa (Serotipo Sp).

ESPECIES DE DESTINO

Salmón del Atlántico (*Salmo salar*), Salmón del Pacífico (*Oncorhynchus kitchi*), Trucha Arcoíris (*O. mykiss*) y Salmón Chinook (*O. tshawytscha*), a partir de los 30 gramos de peso.

INDICACIONES DE USO

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Necrosis Pancreática Infecciosa, producida por virus IPN serotipo Sp, a partir de los 30 gramos de peso.

POSOLOGÍA, EDAD O PESO, CONDICIÓN FISIOLÓGICA, VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosis: 0,1 mL.

Frecuencia: dosis única.

Edad o peso: a partir de los 30 gramos.

Condición fisiológica: peces sanos.

Vía de administración: intraperitoneal.

Modo de empleo:

- Se recomienda dejar a los peces en ayuno mínimo 48 horas previas a la vacunación.
- Se recomienda que la temperatura del agua al momento de la vacunación se encuentre entre 10 y 13 °C.
- Anestesiarse los peces antes de la vacunación.
- Agitar fuertemente los frascos antes y durante su uso.
- Administrar en forma aséptica.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en peces enfermos, o que estén cursando algún cuadro inmunosupresor.

No administrar en peces reproductores.

No administrar durante el período de esmoltificación.

No vacunar peces con un peso menor a 30 gramos.

EFFECTOS ADVERSOS O REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y SEVERIDAD) EN LA(S) ESPECIE(S) DE DESTINO, DERIVADOS DEL USO DEL PRODUCTO INMUNOLÓGICO

Ocasionalmente, el uso de este producto puede producir algún grado de adherencia y/o pigmentación en el interior de la cavidad abdominal, cercana al punto de la inoculación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

Se recomienda no vacunar con temperaturas bajo el rango de los 5 – 6 °C.

Los peces no deben ser trasladados a mar antes de **600 UTA** post vacunación.

La aplicación de este producto debe ser supervisada por un Médico Veterinario.



INTERACCIÓN CON OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUANDO SON ADMINISTRADOS EN FORMA CONCOMITANTE CON EL PRODUCTO INMUNOLÓGICO Y SUS POSIBLES EFECTOS EN EL ANIMAL TRATADO

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual, no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

SOBREDOSIS

La administración del doble de la dosis recomendada, ha demostrado ser segura. Sin embargo, no se recomienda sobredosificar.

PERIODO DE RESGUARDO

Cero días.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

La inyección accidental con este producto puede provocar reacciones adversas en el punto de inoculación.

Se recomienda su aplicación con pistola multidosis y con horquilla de protección.

En caso de inyección accidental del operador, acudir al centro asistencial más cercano.

PRINCIPALES INCOMPATIBILIDADES FÍSICAS O QUÍMICAS CON OTROS PRODUCTOS CON LOS CUALES ES NORMALMENTE DILUIDO, MEZCLADO O COADMINISTRADO

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

PERIODO DE EFICACIA (ESTABILIDAD), INCLUYENDO INFORMACIÓN LUEGO DE LA PRIMERA APERTURA DEL ENVASE Y/O EXTRACCIÓN DE LA PRIMERA DOSIS, SEGÚN CORRESPONDA

18 meses a partir de la fecha de elaboración.

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener refrigerado entre 2 y 8 °C. No congelar.

DESCRIPCIÓN DE LOS ENVASES

Frasco de Polietileno de Alta Densidad, etiquetado, cerrado con tapón de goma y precinto de aluminio y plástico, conteniendo 50, 100, 250, 500 o 1.000 mL, correspondientes a 500, 1.000, 2.500, 5.000 o 10.000 dosis, respectivamente.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SIN UTILIZAR Y EL EQUIPO UTILIZADO PARA SU ADMINISTRACIÓN, SI LAS HUBIERE

Se recomienda utilizar todo el contenido del envase una vez abierto.

No conservar frascos con remanente de producto no utilizado.

Para eliminar los envases y desechos se recomienda la incineración.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

