

# BLUEGUARD® SRS INYECTABLE

Vacuna Inactivada contra el Síndrome Rickettsial del Salmón

Vacunas – Emulsión Inyectable

REGISTRO PROVISIONAL SAG Nº 1868 – BP

## COMPOSICIÓN

Cada dosis de vacuna (0,1 mL) contiene:

*Piscirickettsia salmonis*, Cepa PS 2C

Excipientes c.s.p.

$10^{8,0} - 10^{8,5}$  TCID<sub>50</sub>  
0,1 mL



Inactivante: Formaldehído.

Adyuvantes: Adyuvante oleoso no mineral.

## PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Para estimular la inmunidad activa contra el Síndrome Rickettsial del Salmón.

## ESPECIES DE DESTINO

Salmón del Atlántico (*Salmo salar*), Salmón del Pacífico (Coho) (*Oncorhynchus kisutch*), Trucha Arcoíris (*O. mykiss*) y Salmón Chinook (*O. tshawytscha*), a partir de los 30 gramos de peso.

## INDICACIONES DE USO

Inmunización activa, como ayuda a la prevención contra el Síndrome Rickettsial del Salmón, a partir de los 30 gramos de peso.

## POSOLOGÍA, EDAD O PESO, CONDICIÓN FISIOLÓGICA, VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

**Dosis:** 0,1 mL.

**Frecuencia:** Dosis única.

**Edad o peso:** A partir de 30 gramos.

**Condición fisiológica:** Peces sanos.

**Vía de administración:** Intraperitoneal.

**Modo de empleo:**

- Se recomienda dejar los peces en ayuno mínimo 48 horas previas a la vacunación.
- Se recomienda que la temperatura del agua al momento de la vacunación se encuentre entre 10 y 13 °C.
- Anestésiar los peces antes de la vacunación.
- Agitar fuertemente los frascos antes y durante su uso.
- Administrar en forma aséptica.

## CONTRAINDICACIONES

No administrar en peces enfermos, o que estén cursando algún cuadro inmunosupresor.

No administrar en peces reproductores.

No administrar durante el periodo de esmoltificación.

No vacunar peces con un peso menor a los 30 gramos.

## EFFECTOS ADVERSOS O REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y SEVERIDAD) EN LA(S) ESPECIE(S) DE DESTINO, DERIVADOS DEL USO DEL PRODUCTO INMUNOLÓGICO

El uso de este producto puede producir algún grado de adherencia y/o pigmentación en el interior de la cavidad abdominal, cercana al punto de inoculación.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

Se recomienda no vacunar con temperaturas bajo el rango de los 5 – 6 °C.

Los peces no deben ser trasladados a mar antes de las **600 UTA** post vacunación.

La aplicación de este producto debe ser supervisada por un Médico Veterinario.



## **INTERACCIÓN CON OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUANDO SON ADMINISTRADOS EN FORMA CONCOMITANTE CON EL PRODUCTO INMUNOLÓGICO Y SUS POSIBLES EFECTOS EN EL ANIMAL TRATADO**

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

### **SOBREDOSIS**

La administración del doble de la dosis recomendada ha demostrado ser segura. Sin embargo, no se recomienda sobredosificar.

### **PERIODO DE RESGUARDO**

Cero días.

### **PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR**

La inyección accidental con este producto puede provocar reacciones adversas en el punto de inoculación.

Se recomienda su aplicación con pistola multidosis y con horquilla de protección. En caso de inyección accidental del operador, acudir al centro asistencial más cercano.

### **PRINCIPALES INCOMPATIBILIDADES FÍSICAS O QUÍMICAS CON OTROS PRODUCTOS CON LOS CUALES ES NORMALMENTE DILUIDO, MEZCLADO O COADMINISTRADO**

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

### **PERIODO DE EFICACIA (ESTABILIDAD), INCLUYENDO INFORMACIÓN LUEGO DE LA PRIMERA APERTURA DEL ENVASE Y/O EXTRACCIÓN DE LA PRIMERA DOSIS, SEGÚN CORRESPONDA**

18 meses a partir de la fecha de elaboración.

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Mantener refrigerado entre 2 y 8 °C. No congelar.

### **DESCRIPCIÓN DE LOS ENVASES**

Frasco de Polietileno de Alta Densidad, etiquetado, cerrado con tapón de goma y precinto de aluminio y plástico conteniendo 50, 100, 250, 500 o 1.000 mL, correspondiente a 500, 1.000, 2.500, 5.000 o 10.000 dosis.

### **PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SIN UTILIZAR Y EL EQUIPO UTILIZADO PARA SU ADMINISTRACIÓN, SI LAS HUBIERE**

Se recomienda utilizar todo el contenido del envase una vez abierto.

No conservar frascos con remanente de producto no utilizado.

Para eliminar los envases y desechos se recomienda la incineración.

**Venta bajo Receta Médico Veterinaria.**

### **USO VETERINARIO**

