

# COLIPRIM®

**Sulfacloropiridazina sódica 100 mg/mL,  
Trimetoprima 20 mg/mL.**

**Antibióticos – Solución Oral**

**Reg. SAG N° 113**

## COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:

Sulfacloropiridazina sódica  
(Equivalente a 9,253 g de Sulfacloropiridazina base)  
Trimetoprima  
Excipientes c.s.p.

10 g  
2 g  
100 mL



## ESPECIES DE DESTINO

Pollos broiler, Pollas de reemplazo, Bovinos (terneros pre-rumiantes), Ovinos (corderos pre-rumiantes), Cerdos y Conejos.

## INDICACIONES DE USO

Tratamiento de procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a Sulfacloropiridazina.

## DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

### Dosificación:

**Pollos broiler, Pollas de reemplazo y Conejos:** 1 – 1,5 mL de Coliprim®/litro de agua de bebida (equivalente a 30 mg/kg peso vivo), por 5 días.

**Cerdos, Bovinos y Ovinos:** 1 mL de Coliprim®/8 kg de peso vivo (equivalente a 15 mg/kg de peso vivo), por 5 días, en agua de bebida, leche o sustituto lácteo.

**Vía de administración:** Vía oral en el agua de bebida, leche o sustituto lácteo en el caso de pre-rumiantes.

## ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

### Mantener fuera del alcance de los niños

Emplear con precaución en animales con insuficiencia renal o hepática.

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a las Sulfonamidas.

No administrar a hembras preñadas, en lactancia ni durante la postura.

No administrar en bovinos y ovinos fuera de la etapa de pre-rumiante.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

## PERIODO DE RESGUARDO

**Pollos broiler, Pollas de reemplazo, Bovinos, Ovinos, Cerdos y Conejos:** 30 días.

No administrar a vacas y ovejas cuya leche se destine a consumo humano.

No administrar a gallinas en postura cuyos huevos se destinen a consumo humano.

**Venta bajo Receta Médico Veterinaria.**

## USO VETERINARIO

## PRESENTACIÓN

Envases de 1 L y 5 L.

FT0056NAC07062019R1V1

