

# DIGESTOYET®

Menbutona 10%

Otros productos - Solución Inyectable

REG. SAG N° 2147

## COMPOSICIÓN

Cada mL de solución contiene:

Menbutona	100 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

## ESPECIES DE DESTINO

Bovinos y Cerdos.

## INDICACIONES DE USO

Normalizador del funcionalismo gástrico, duodenal y biliar, indicado en aquellas situaciones en que se requiere una estimulación de las secreciones digestivas, tales como:

Bovinos: Indigestiones, toxemias, cetosis, anorexia, insuficiencias hepática y pancreática.

Cerdos: Indigestiones, anorexia, intoxicaciones e insuficiencias hepática y pancreática.

## DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación: 10 mg de Menbutona/kg p.v. (equivalente a 1 mL de Digestoyet® por cada 10 kg de peso vivo por día).

En caso necesario puede repetirse la dosis a las 24 y 48 horas.

Vía de administración:

Intramuscular profunda o intravenosa lenta.

Modo de empleo:

Volúmenes mayores de 20 mL se deben dividir en varios puntos de inyección.

Administrar de forma aséptica.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

La administración IV debe hacerse lentamente (en un tiempo no inferior a 1 minuto) para evitar la aparición de reacciones adversas.

Ante una alteración del aparato digestivo, es necesario identificar y tratar adecuadamente la causa subyacente, ya que, en caso contrario, el tratamiento con el medicamento veterinario podría no ser eficaz.

## CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con alteraciones cardíacas, hipertermia u obstrucción en las vías biliares.

No administrar en gatos en ningún caso.

No administrar a hembras en el último tercio de gestación.

No administrar a hembras lactantes.

No administrar en animales hipersensibles a Menbutona.

## EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

La administración intramuscular puede provocar reacción en el punto de inyección, consistente en necrosis del tejido muscular, edema y hemorragia, a veces acompañados de dolor en muy raras ocasiones. Estas lesiones fueron detectables microscópicamente 28 días después de la administración. Tras la administración por vía intravenosa de forma excesivamente rápida pueden aparecer temblores, respiración acelerada, defecación espontánea, tos, lagrimeo, estornudos y caída del animal en muy raras ocasiones.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: menos de 30 °C y al abrigo de la luz. No refrigerar ni congelar.

Utilizar inmediatamente una vez abierto y eliminar el producto sobrante.

## PERIODO DE RESGUARDO

Bovinos: Carne: 2 días. Leche: 48 horas.

Cerdos: Carne: 2 días.

## PRESENTACIONES

Fascos de 20 mL y 100 mL.

**Venta bajo Receta Médico Veterinaria.**

## USO VETERINARIO



FT0150NAC28022024R3V2

