

DEXABIOPEN®

Penicilina G Procaína 200 mg/mL, Dihidroestreptomicina 200 mg/mL, Dexametasona 500 µg/mL

Antibióticos – Suspensión Inyectable

REG. SAG Nº 111 - B



COMPOSICIÓN

Cada mL de producto contiene:

Penicilina G Procaína (Equivalente a 114 mg de Penicilina G base)	200 mg
Dihidroestreptomicina sulfato (Equivalente a 200 mg de Dihidroestreptomicina)	250 mg
Dexametasona fosfato sódico (Equivalente a 500 µg de Dexametasona)	680 µg
Excipientes c.s.p.	1 mL

ESPECIES DE DESTINO

Equinos, Bovinos, Cerdos, Ovinos, Caprinos y Perros.

INDICACIONES DE USO

En todos los procesos causados por microorganismos sensibles a la penicilina y a la estreptomicina y en las infecciones mixtas. Muy recomendable también en los procesos secundarios a virosis. En general, en septicemias hemorrágicas, colibacilosis, coriza, complicaciones de influenza, neumonías, bronconeumonías, mastitis, metritis, procesos supurados que no responden a la aplicación de penicilina como tratamiento único, salmonelosis, leptospirosis, espiroquetas, gangrenas, tétanos, carbunco, etc.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

Caballos, Bovinos, Ovinos, Caprinos, Cerdos y Perros:

10.000 – 20.000 UI/kg p.v. de Penicilina G Procaína + 10 – 20 mg/kg p.v. de Dihidroestreptomicina + 0,025 – 0,05 mg/kg p.v. de Dexametasona al día, durante 3 días.

Esto equivale a 1 mL de Dexabiopen por cada 10 – 20 kg p.v. al día, durante 3 días.

Vía de administración: Vía intramuscular profunda.

ADVERTENCIAS, CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños

No administrar volúmenes superiores a 20 mL en un punto de inyección

No emplear al mismo tiempo que antibióticos bacteriostáticos.

No utilizar en animales sensibilizados a la penicilina o con insuficiencia renal.

No utilizar en gatos ni en roedores.

No utilizar en animales con edad inferior a un mes

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 25 °C, y al abrigo de la luz.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 30 días.

Bovino: Leche 60 horas.

No administrar a ovejas y cabras cuya leche sea destinada a consumo humano.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Envases de 100.

FT0058NAC14032024R2V2

