

DULAN® 10%

Tilosina 10%

Antibióticos - Polvo Oral

REG. SAG Nº 1567 - B

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:

Tilosina fosfato	11,1 g
(Equivalente a 10 gramos de Tilosina base)	
Excipientes c.s.p.	100 g



ESPECIES DE DESTINO

Aves (pollas de reemplazo) y Cerdos.

INDICACIONES DE USO

Cerdos: Se utiliza para tratamientos de la Disentería Porcina causada por microorganismos sensibles a Tilosina. También está indicado el uso para el tratamiento de la Enteritis Proliferativa (Ileítis), asociada con *Lawsonia intracellularis*, y como ayuda en el tratamiento de la Rinitis Atrófica y Neumonía Enzootica causada por *Mycoplasma* spp.

Aves (pollas de reemplazo): Se usa para el tratamiento del Complejo Respiratorio Crónico causado por *Mycoplasma gallisepticum*.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

Cerdos:

Tratamiento de Disentería Porcina: 3 - 7 mg de Tilosina base/kg de peso vivo, equivalente a 30 - 70 mg de Dulan® 10%/kg de peso vivo, por 15 a 21 días.

Tratamiento de neumonías: 3 - 7 mg de Tilosina base/kg de peso vivo, equivalente a 30 - 70 mg de Dulan® 10%/kg de peso vivo, por 15 a 21 días.

Tratamiento de Enteritis Proliferativa (Ileítis), asociado con *Lawsonia intracellularis*: 3 - 7 mg de Tilosina base/kg de peso vivo, equivalente a 30 - 70 mg de Dulan® 10%/kg de peso vivo, por 15 a 21 días.

Aves (pollas de reemplazo):

Tratamiento de Complejo Respiratorio Crónico: 35 mg de Tilosina base/kg de peso vivo, equivalente a 350 mg de Dulan® 10%/kg de peso vivo, por 5 a 7 días.

Vía de administración: Vía oral en el alimento.

ADVERTENCIAS, CONTRAINDICACIONES, EFECTOS NO DESEADOS Y REACCIONES ADVERSAS

Mantener fuera del alcance de los niños

La actividad de la Tilosina se reduce en medio ácido

No administrar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a la droga, insuficiencia renal o hepática.

No administrar en hembras gestantes o en lactancia.

No utilizar en aves de postura.

En los cerdos, los efectos adversos comunicados incluyen edema de la mucosa rectal, prolapso anal con prurito, eritema y diarrea.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

FT0045NAC06062019R1V1



PERIODO DE RESGUARDO

Aves: 5 días.

Cerdos: 14 días.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Envases de 10 kg y 25 kg.

FT0045NAC06062019R1V1

