

# EHLIPROFENO® 20

Antiinflamatorios - Comprimidos Orales

REG. SAG Nº 1832

## COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:  
Carprofeno 20 mg  
Excipientes c.s.p. 1 comprimido

## ESPECIES DE DESTINO

Perros.

## INDICACIONES DE USO

Indicado para aliviar el dolor y la inflamación asociada a osteoartritis y para el control del dolor post operatorio asociado a cirugía de tejidos blandos y ortopédica en perros.

## DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosis: 2 mg de carprofeno/kg de peso vivo/cada 12 horas (equivalente a 1 comprimido de Ehliprofeno® 20/cada 10 kg de peso vivo/cada 12 horas) o 4 mg de carprofeno/kg de peso vivo/cada 24 horas (equivalente a 2 comprimidos de Ehliprofeno® 20/cada 10 kg de peso vivo/cada 24 horas).

La duración del tratamiento depende del caso:

**Osteoartritis:** durante 28 días.

**Post operatorio:** durante 5 días.

**Dolor agudo:** por un día.

Los tratamientos a largo plazo deben ser establecidos bajo supervisión Médico Veterinaria regular.

Vía de administración: Oral.

## ADVERTENCIAS

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

## CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad al carprofeno.

No administrar en perros con trastornos hemorrágicos, enfermedad cardiovascular o deshidratados, con enfermedad gastrointestinal, renal o con hipoproteinemia.

No administrar a perros menores de 6 semanas de edad.

No administrar en gatos.

No administrar en hembras gestantes ni en lactación.

## EFFECTOS NO DESEADOS Y REACCIONES ADVERSAS

Los efectos adversos son poco comunes en perros, siendo los efectos digestivos leves los más frecuentes. Algunos perros pueden presentar disminución del apetito, vómitos, diarrea, melena. Los efectos más graves descritos son daño hepatocelular (mayor predisposición en Labrador Retriever), enfermedad renal, alteraciones hematológicas y problemas gastrointestinales marcados. Por este motivo, se recomienda evaluar al paciente antes de administrar carprofeno y considerar con el propietario los riesgos potenciales frente a los beneficios del tratamiento.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C, en lugar seco y protegido de la luz solar.

## PRESENTACIÓN

Blíster con 10 comprimidos.

## USO VETERINARIO

**Venta bajo Receta Médico Veterinaria**

