

# ENROMIC® 20%

## Antibióticos - Polvo Oral

Reg. SAG N° 0469

### COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:  
Enrofloxacino 20 g  
Excipientes c.s.p. 100 g

### ESPECIES DE DESTINO

Pollos broiler, Pollas de reemplazo, Pavos y Cerdos.

### INDICACIONES DE USO

Tratamiento de procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a Enrofloxacino, tales como:

**Pollos broiler y pollas de reemplazo:** *Escherichia coli*, *Mycoplasma spp.*, *Avibacterium paragallinarum*, *Salmonella spp.*, y *Pasteurella spp.*

**Pavos:** *Escherichia coli*, *Mycoplasma spp.*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, y *Erisipelothrix spp.*

**Cerdos:** *Escherichia coli*, *Mycoplasma spp.*, *Haemophilus parasuis*, *Bordetella bronchiseptica*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, y *Erisipelothrix spp.*

### DOSIFICACIÓN Y VIA DE ADMINISTRACIÓN

#### Dosificación:

**Pollos broiler, Pollas de reemplazo y Pavos:** 10 mg de Enrofloxacino/kg de peso/día durante 3 - 5 días, lo que equivale a 50 mg de Enromic® 20%/kg de peso vivo/día por 3 a 5 días.

**Cerdos:** 2,5 a 5,0 mg de Enrofloxacino/kg de peso/día durante 3 días, lo que equivale a 12,5 a 25 mg de Enromic® 20%/kg de peso/día por 3 días.

**Via de administración:** Via oral, en el alimento.

### ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO Y CONTRAINDICACIONES

#### Mantener fuera del alcance de los niños

Emplear con precaución en animales muy jóvenes, ya que puede causar daño en el cartílago de crecimiento.

Emplear con precaución en animales con insuficiencia renal o hepática.

El uso de Fluoroquinolonas debe ser reservado para el tratamiento de aquellos casos clínicos que hayan respondido de forma escasa, o cuando se espera que no respondan a otra clase de antimicrobiano.

Las Fluoroquinolonas no deben utilizarse como primera línea de tratamiento, a menos que esté justificado. Sólo deben utilizarse, en lo posible, en base a pruebas de susceptibilidad.

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida al principio activo.

No emplear en animales con trastornos en el cartílago articular.

No administrar en hembras preñadas, en lactancia ni durante la postura.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15° y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

### PERIODO DE RESGUARDO

Pollos broiler y Pollas de reemplazo: 7 días.

Pavos: 10 días.

Cerdos: 10 días.

No administrar a gallinas en postura cuyos huevos se destinen a consumo humano.

**Venta bajo Receta Médico Veterinaria Retenida.**

### USO VETERINARIO

### PRESENTACIÓN

Envases de 10 y 20 kg.



FT0046NAC06062019R1V1

