

ENROMIC® 20%

Antibióticos - Solución Oral

Reg. SAG N° 2255

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:
Enrofloxacino 20 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Pollos broiler y pollas de reemplazo.

INDICACIONES

Para el tratamiento de infecciones causadas principalmente por bacterias Gram negativas (como: *Escherichia coli*, *Pasteurella* spp. y *Salmonella* spp.) y *Mycoplasma* spp., sensibles a Enrofloxacino.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

10 mg de Enrofloxacino/kg peso vivo/día (equivalente a 0,05 mL de Enromic® 20% solución oral/ kg peso vivo), por 3 a 5 días.

Vía de administración: Vía oral, en el agua de bebida.

ADVERTENCIAS, CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños

El uso de Fluoroquinolonas debe ser reservado para el tratamiento de aquellos casos clínicos que hayan respondido de forma escasa, o cuando se espera que no respondan a otra clase de antimicrobiano.

Las Fluoroquinolonas, como Enrofloxacino, no deben utilizarse como primera línea de tratamiento, a menos que esté justificado. Sólo deben utilizarse, en lo posible, en base a pruebas de susceptibilidad.

El uso del producto en condiciones distintas a las recomendadas, puede incrementar la prevalencia de bacterias resistentes a las Fluoroquinolonas y disminuir la eficacia del tratamiento con otras Quinolonas, debido a la resistencia cruzada.

Utilizar inmediatamente una vez preparado. Descartar la solución sobrante.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Carne: 10 días.

No administrar a aves cuyos huevos se destinen a consumo humano.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria Retenida.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Envases de 1000 mL y 5 L.

