



LUTEOSYL®

d-Cloprostenol 0,075 mg/mL

Hormonas de Reproducción – Solución Inyectable



REG. SAG N° 2341

COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:

d-Cloprostenol de sodio (equivalente a d-Cloprostenol 0,075 mg)	0,079 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

ESPECIES DE DESTINO

Vacas.

INDICACIONES DE USO

- Indicaciones para la reproducción: Sincronización o inducción del estro. Inducción de parto.
- Indicaciones terapéuticas: Disfunción ovárica (cuerpo lúteo persistente, quiste luteal), interrupción de la gestación incluyendo momificación fetal, endometritis/piometra, involución uterina retardada.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

La dosis recomendada es de 0,150 mg d-cloprostenol/animal, equivalente a 2 mL/animal.

- Inducción del estro (también en vacas que presentan celo débil o silente): Administrar el producto, después de determinar la presencia del cuerpo lúteo (6° - 18° día del ciclo). Se observa celo generalmente en 48-60 horas. Inseminar 72-96 horas después del tratamiento anterior. Si no se observa celo, repetir después de 11 días.
- Inducción del parto: Administrar el producto después del día 270 de gestación. El parto debería producirse 30-60 horas después del tratamiento.
- Sincronización del estro: Administrar el producto dos veces (con un intervalo de 11 días). Inseminar artificialmente 72 y 96 horas después de la segunda inyección.
- Disfunción ovárica: Una vez determinada la presencia del cuerpo lúteo, administrar el producto e inseminar en el primer celo siguiente al tratamiento. Si no se observa celo, llevar a cabo otro examen ginecológico y repetir la inyección tras un intervalo de 11 días posteriores al primer tratamiento. La inseminación se lleva a cabo 72-96 horas después del tratamiento.
- Endometritis o piometra: Administrar 1 dosis del producto. Si es necesario repetir el tratamiento 10 - 11 días después.
- Interrupción de la gestación: Administrar el producto durante la primera mitad de la gestación.
- Momificación fetal: Administrar 1 dosis del producto. El feto será expulsado después de 3 o 4 días.
- Involución uterina retardada: Administrar 1 dosis del producto y, si está indicado, repetir el tratamiento una o dos veces con un intervalo de 24 horas.

Vía de administración: Intramuscular.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Al igual que para la administración parenteral de cualquier sustancia, deben aplicarse medidas antisépticas básicas. El lugar de inyección debe ser limpiado y desinfectado adecuadamente con objeto de reducir el riesgo de infección por bacterias anaerobias.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricado por:
Laboratorios Syva S.A.
Avenida de Párroco Pablo Díez, 49-57
San Andrés del Rabanedo
24010 León - España

Importado y distribuido por:
Centrovet Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago.
www.virbac.cl
Bajo licencia de Laboratorios Syva S.A., España.





LUTEOSYL®

d-Cloprostenol 0,075 mg/mL

Hormonas de Reproducción – Solución Inyectable

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en animales gestantes a menos que sea deseable la inducción del parto o la interrupción terapéutica de la gestación.

No administrar a animales con hipersensibilidad al principio activo.

No administrar a animales con disfunción espástica del tracto digestivo y/o sistema respiratorio.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

Es probable la aparición de infección anaerobia cuando se produzca penetración de bacterias anaerobias en el lugar de inyección. Esto afecta especialmente a la inyección intramuscular y en particular a las vacas. Las reacciones locales debidas a infección anaerobia son inflamación y crepitación en el lugar de inyección.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: menos de 25 °C. No refrigerar ni congelar.

Una vez abierto mantener entre 15 y 25 °C, utilizar antes de 28 días.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 1 día.

Leche: 0 horas.

PRESENTACIÓN

Envases de 20 mL.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria Retenida

USO VETERINARIO

FT0020NAC04032024R2V1

Fabricado por:

Laboratorios Syva S.A.
Avenida de Párroco Pablo Díez, 49-57
San Andrés del Rabanedo
24010 León - España

Importado y distribuido por:

Centrovet Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago.
www.virbac.cl
Bajo licencia de Laboratorios Syva S.A., España.

