

MEGALON®

Vitamina A 500.000 UI + Vitamina D3 75.000 UI + Vitamina E 50 UI

Vitaminas. – Solución Inyectable

REG. SAG N° 2475



Vitaminas

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de producto contiene:

Vitamina A (Equivalente a 500.000 UI de Vit A)	220 mg
Vitamina D3 (Equivalente a 75.000 UI de Vit D3)	1,969 mg
Vitamina E acetato (Equivalente a 50 UI de Vit E)	52,5 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, Caballos, Ovinos y Caprinos.

INDICACIONES DE USO

La Solución MEGALON® inyectable, puede utilizarse para remediar las deficiencias de vitaminas A, D3 y E en las especies de destino y como tratamiento en las enfermedades producidas por la carencia de estas vitaminas; como suministro de vitaminas A, D3 y E, para el tratamiento de enfermedades en animales jóvenes (como raquitismo) y en animales adultos (osteomalacia), debido a necesidades crecientes de vitaminas ausentes en los alimentos (especialmente vitamina D).

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

Especie	MEGALON®	Vía de administración
Bovino, Caballo	3-6 mL	Intramuscular profunda (i.m)
Novillo, Potrillo	1-2 mL	Intramuscular profunda (i.m)
Ternero	0,5-1 mL	Intramuscular profunda (i.m)
Ovino, Caprino	1-2 mL	Subcutánea (s.c)
Cordero, Cabrito	0,25-0,5 mL	Subcutánea (s.c)

Vía de administración: Subcutánea e intramuscular

Modo de empleo: Se debe administrar la dosis al interior del músculo o de forma subcutánea, a menos que el médico veterinario lo indique de otro modo. La dosis se puede repetir cada 1-3 meses.



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Consulte con el médico veterinario antes de usar y si se presenta algún efecto inesperado.

MEGALON® está indicado para animales reproductores, 7-8 semanas antes del periodo de reproducción. Está indicado para animales gestantes, cuando se aplica en el último tercio de gestación, proporcionando soporte para el desarrollo de las crías.

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES

No conocidos

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

Puede tener lugar una pequeña reacción donde se aplique la inyección, la cual se cura después de un corto tiempo.

La administración de vitamina D3 en grandes dosis y por períodos de tiempo largos, puede hacer que el calcio (Ca) y fósforo (P) sea liberado de los huesos, aumentando los iones a nivel de circulación sanguínea. Como resultado de esto, la calcificación de algunos tejidos y órganos blandos puede ser observada. Si se utiliza la vitamina A en exceso, puede causar hipervitaminosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Cero días

PRESENTACIONES

100 y 250 mL

USO VETERINARIO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

