

MICRODES® 1%

Ivermectina 1%

Antiparasitarios – Solución Inyectable

REG. SAG N° 125 - B



COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contienen:

Ivermectina 1 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, Ovinos y Cerdos.

INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales (incluyendo formas inhibidas) como *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Oesophagostomum* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Bunostomum* spp., *Strongyloides* spp., *Trichuris* spp., *Chabertia ovina*, *Ascaris suum*, *Hyostrogylus rubidus*; nematodos pulmonares como *Dictyocaulus* spp. y *Metastrongylus* spp.; piojos chupadores como *Haematopinus* spp. y *Linognathus* spp., y ácaros de la sarna (*Sarcoptes* spp. y *Psoroptes ovis*).

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

Bovinos y Ovinos: Dosis única de 200 µg de Ivermectina/kg de peso vivo, equivalente a 1 mL de Microdes® 1%/50 kg de peso vivo.

Cerdos: Dosis única de 300 µg de Ivermectina/kg de peso vivo, equivalente a 1 mL de Microdes® 1%/33 kg de peso vivo.

Vía de administración: Vía subcutánea exclusivamente. En cerdos, inyectar sólo en el cuello.

Modo de empleo:

Agitar bien antes de usar.

Administrar en forma aséptica.

No administrar más de 10 mL por punto de inoculación, en bovinos adultos. En terneros, administrar 2,5 a 5 mL por punto de inoculación, según el peso del animal.

No administrar más de 5 mL por punto de inoculación, en cerdos adultos. En lechones, administrar hasta 1 mL por punto de inoculación, según el peso del animal.

No administrar más de 5 mL por punto de inoculación, en ovinos adultos. En corderos, administrar hasta 2,5 mL por punto de inoculación, según el peso del animal.

Cuando se exceda esa cantidad por animal, deberá inyectarse en otro punto.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida al principio activo.

No administrar por vía endovenosa o intramuscular.

No administrar durante la lactancia de los terneros, corderos y lechones.

No administrar a otras especies animales, ya que pueden producirse reacciones severas, incluso la muerte en perros.

No administrar en animales debilitados.

EFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

En bovinos y ovinos puede presentarse dolor y, ocasionalmente, inflamación en el sitio de inyección, lo cual se resuelve sin tratamiento. La administración de antihelmínticos inyectables puede ocasionar lesiones en la musculatura adyacente al tejido subcutáneo.



MICRODES® 1%

Ivermectina 1%

Antiparasitarios – Solución Inyectable



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: a no más de 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

No refrigerar ni congelar.

Conservar en su envase original, bien cerrado.

Una vez abierto el producto, utilizar dentro de 28 días y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento ya mencionadas.

PERIODO DE RESGUARDO

Carne: 49 días.

No administrar en vacas y ovejas cuya producción de leche esté destinada al consumo humano.

PRESENTACIÓN

Frascos de 25, 50, 100 y 500 mL.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

Antiparasitarios

FT0139NAC28102022R2V2

