

# MICRODES® 0,2%

Ivermectina 0,2%

Antiparasitarios – Polvo Oral

REG. SAG N° 1669 - B



## COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contienen:

Ivermectina	0,2 g
Excipientes c.s.p.	100 g

## ESPECIES DE DESTINO

Cerdos en desarrollo y adultos.

## INDICACIONES DE USO

Tratamiento y control de nematodos gastrointestinales (*Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp.), pulmonares (*Metastrongylus* spp.), y ácaros de la sarna (*Scarcoptes scabiei var suis*).

## DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

### Dosificación:

100 µg de Ivermectina/kg de peso vivo/24 horas, equivalente a 0,05 g Microdes® 0,2%/kg de peso vivo/día.

Administrar por 7 días consecutivos.

Vía de administración: Oral en el alimento.

### Modo de empleo:

**Cerdos en desarrollo:** Para obtener la dosis de 100 µg de Ivermectina/kg de peso vivo, se debe aplicar 1.000 gramos de Microdes® 0,2%/tonelada de alimento (2 ppm de principio activo), por 7 días consecutivos.

**Cerdos adultos:** Para obtener la dosis de 100 µg de Ivermectina/kg de peso vivo diariamente por 7 días consecutivos, se debe considerar el peso de las chanchillas, cerdas reproductoras y verracos y, además, las prácticas de alimentación. La dosis práctica (ppm) se obtiene multiplicando la dosis de principio activo por el peso del animal, y este resultado dividiéndolo por el consumo de alimento de los animales, según peso y edad.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

### Mantener fuera del alcance de los niños.

No descritas para la especie de destino y por la vía recomendada.

El uso frecuente y repetido de antihelmínticos de la misma clase durante un periodo prolongado, subdosificar como resultado de un mal cálculo del consumo de alimento medicado, o la administración inapropiada del producto son prácticas que deben evitarse ya que aumentan el riesgo del desarrollo de resistencia. Cualquier sospecha de casos clínicos de resistencia a los antihelmínticos debe ser investigada en profundidad utilizando técnicas apropiadas. Cuando sus resultados sugieran firmemente la posibilidad de resistencia a un antihelmíntico en particular, se recomienda utilizar otro perteneciente a otra clase farmacológica u modo de acción.

## CONTRAINDICACIONES

No descritas para la especie de destino y por la vía recomendada.

No debe ser aplicado a otras especies ya que pueden ocurrir reacciones adversas severas, como la muerte, por ejemplo, en perros.

## EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

No descritas para la especie de destino y por la vía recomendada.



# MICRODES® 0,2%

Ivermectina 0,2%

Antiparasitarios – Polvo Oral

REG. SAG N° 1669 - B



Antiparasitarios

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

## PERIODO DE RESGUARDO

49 días.

## PRESENTACIÓN

10 kg.

**Venta bajo Receta Médico Veterinaria.**

## USO VETERINARIO

FT0187NAC08092022R2V2

