



# PEDEROL®

Clortetraciclina clorhidrato 2%

Antibióticos – Aerosol Tópico

REG. SAG N° 2070 - B

## COMPOSICIÓN

Clortetraciclina clorhidrato (Equivalente a 18,6 mg de Clortetraciclina base)	20 mg
Excipientes c.s.p.	1 g

## ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Cerdos y Caballos.

## INDICACIONES DE USO

Tratamiento de heridas quirúrgicas y superficiales traumáticas contaminadas por microorganismos sensibles a Clortetraciclina: *Streptococcus* spp., *Haemophilus* spp., *Klebsiella* spp., *Clostridium* spp., *Fusobacterium* spp.

Coadyuvante en el tratamiento de infecciones superficiales de las pezuñas y la piel, en particular dermatitis interdigital (pedero) y dermatitis digital causadas por microorganismos sensibles a la Clortetraciclina.

## DOSIFICACIÓN, VÍA ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

### Dosificación:

Pulverizar la zona afectada desde una distancia de 20 cm durante unos segundos hasta cubrir el área a tratar obteniendo una coloración homogénea de la zona tratada.

Repetir el tratamiento según evolución y gravedad de las lesiones cada 24 horas, durante un máximo de 5 días. Si en ese tiempo no hay una evolución favorable, considerar un tratamiento alternativo.

Vía de administración: Tópica.

### Modo de empleo:

Agitar antes de usar.

Limpia la zona afectada y retirar el tejido necrosado antes de aplicar el producto.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:

No aplicar sobre los ojos, ya que puede aparecer una irritación local.

Evitar el contacto o lámido de la zona afectada durante 5 minutos.

### Mantener fuera del alcance de los niños.

Si dentro de 48 horas no existen resultados, suspender el tratamiento y consultar con el médico veterinario.

## CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con historial de hipersensibilidad a las Tetraciclinas.

No administrar en periodo de gestación o lactancia.

No administrar en heridas en la glándula mamaria.

No administrar en heridas abiertas, heridas graves o en focos purulentos.

## EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad y reacciones cutáneas locales en muy raras ocasiones.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: menos de 30°C. No refrigerar ni congelar.

## PERIODO DE RESGUARDO

Carne y leche: Cero (0) días.

## PRESENTACIÓN

Envases de 250 mL.

**Venta bajo Receta Médico Veterinaria.**

**USO VETERINARIO**



Antibióticos

FT0147NAC28022024R3V1

Fabricado por:  
PREVAL S.A.  
Avda. Castell de Barberá, 43-45  
Barberá del Vallés  
08210 Barcelona - España.

Para:  
Laboratorios Syva S.A., España.  
Avenida del Párroco Pablo Díez, 49-57  
San Andrés del Rabanedo  
24010 León - España.

Importado y distribuido por:  
Centrovet Ltda.  
Avenida Los Cerrillos 602, Cerrillos, Santiago, Chile.  
www.virbac.cl  
Bajo licencia de:  
Laboratorios Syva S.A., España.

