

PENDISTREP®

Bencilpenicilina procaína 200.000 UI - Dihidroestreptomicina sulfato 250 mg
Antibióticos – Suspensión Inyectable



REG. SAG Nº 706 - B

COMPOSICIÓN

Cada mL de producto contiene:	
Bencilpenicilina procaína	200.000 UI
Dihidroestreptomicina sulfato (Equivalente a 250 mg de dihidroestreptomicina base)	312,5 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Cerdos y Caballos.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento de infecciones bacterianas, postoperatorias y/o secundarias a infecciones víricas, causadas por microorganismos sensibles a la asociación, tales como:

Bovinos, Ovinos, Caprinos: Abscesos cutáneos, actinomicosis, afecciones podales, artritis, mastitis, metritis, neumonía y bronconeumonía.

Cerdos: Artritis, aborto, leptospirosis, erisipela, neumonía y bronconeumonía, y síndrome MMA.

Caballos: Metritis, neumonía y bronconeumonía, papera.

Producidas por los microorganismos siguientes:

Corynebacterium spp., *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Clostridium* spp., *Erysipelothrix* spp., *Nocardia* spp., *Listeria* spp., *Vibrio* spp., *Actinomyces* spp., *Fusobacterium necrophorum*, *Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp., *Actinobacillus* spp., *Proteus* spp., *Neisseria* spp., Algunas *Rickettsias*, *Leptospira* spp., espiroquetas (*Borrelia*, *Treponema*), *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Shigella* spp., *Salmonella* spp. (Algunas especies), *Yersinia* spp., cepas de *Actinomyces bovis*, *Leptospira* spp., *Mycobacterium* spp., *Brucella* spp., *Campylobacter fetus*.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

6.000 - 12.000 UI de Bencilpenicilina procaína + 6 - 12 mg de dihidroestreptomicina/kg p.v. día (equivalente a 1 mL de PENDISTREP® por 20-30 kg p.v.)

Continuar el tratamiento hasta 1 o 2 días después de la remisión de los síntomas (durante 3 días como mínimo).

Vía de administración: Vía intramuscular.

Modo de empleo:

Administrar en forma aséptica.

Agitar antes de usar.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños

No administrar en:

- Animales con hipersensibilidad a las penicilinas y/o aminoglucósidos.
- Animales con insuficiencia renal, hepatopatías, cardiopatías o con lesiones cocleovestibulares.
- Animales con edad inferior a un mes.
- Conejos, cobayas y hamsters.

No administrar en hembras gestantes, por existir riesgo de toxicidad cocleovestibular fetal.

No administrar en lactancia.

No administrar volúmenes superiores a 20 mL en un punto de inyección.



PENDISTREP®

Bencilpenicilina procaína 200.000 UI - Dihidroestreptomicina sulfato 250 mg

Antibióticos – Suspensión Inyectable



Antibióticos

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: menos de 25°C. No refrigerar ni congelar. Utilizar inmediatamente una vez y descartar el producto sobrante.

PERIODO DE RESGUARDO

Carne: 30 días.

No administrar a caballos cuya carne se destine a consumo humano.

No administrar a animales en producción de leche para consumo humano.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Envases de 10, 50, 100 y 250 mL

FT0109NAC15022024R2V2

Fabricado por:
Laboratorios SYVA S.A.
Parque Tecnológico de León,
Calle Nicestrato Vela, M15-16, 24010 León - España

Importado y distribuido por:
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos, Santiago, Chile

Bajo licencia de
LABORATORIOS SYVA S.A., España.

