

VETERIN® 50%

Antibióticos - Polvo Oral

Reg. SAG N° 1556

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:
 Florfenicol 50 g
 Excipientes c.s.p. 100 g

ESPECIES DE DESTINO

Salmónidos.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento y control de patologías causadas por *Piscirickettsia salmonis*, *Flavobacterium psychrophilum*, *Yersinia ruckeri*, *Vibrio ordalii*, *Vibrio anguillarum*, *Aeromonas salmonicida* atípica y *Renibacterium salmoninarum*, previa confirmación de sensibilidad frente al antimicrobiano.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración vía oral en el alimento.

10 mg de Florfenicol/kg de pez/día (equivalente a 20 mg de Veterin® 50%/kg de pez), por un periodo de 10 días consecutivos.

Tasa de Alimentación por kg/pez (%)	Gramos de Veterin® 50%/tonelada de alimento
0,5	4.000
1,0	2.000
2,0	1.000
3,0	666

PERIODO DE RESGUARDO

300 grados días.

ADVERTENCIAS, CONTRAINDICACIONES, EFECTOS NO DESEADOS Y REACCIONES ADVERSAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

De acuerdo a las buenas prácticas de uso, se recomienda administrar el producto basado en pruebas de susceptibilidad.

No administrar en reproductores.

No descriptos a la dosis, frecuencia y duración de tratamiento recomendados.

CONTRAINDICACIONES, EFECTOS NO DESEADOS Y ADVERTENCIAS

No administrar en reproductores.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PRESENTACIÓN

Envases de 10 kg.

USO VETERINARIO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria

FT0034NAC22102018R1V1

