



VIRBAC MILPRO® 4 MG/10 MG.

Milbemicina oxima 4 mg + Praziquantel 10 mg.

Antiparasitario – Comprimido Oral.

REG. SAG N° 2457 – B

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene

Milbemicina oxima

Praziquantel

Excipientes c.s.p.

4 mg
10 mg
1 Comprimido



Antiparasitario

ESPECIE DE DESTINO

Gatos desde 0,5 a 2 kg de peso

INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento de la infestación endoparasitaria mixta de cestodos (*Dipylidium caninum* y *Echinococcus multilocularis*) y nematodos (*Ancylostoma tubaeforme* y *Toxocara cati*).

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

La dosis corresponde a 2 mg de Milbemicina oxima y 5 mg de Praziquantel/kg peso corporal. La dosis de producto según peso del gato, es la siguiente:

Peso (KG)	N° de comprimidos
0,5 – 1 kg	1/2 comprimido
>1 – 2 kg	1 comprimido

La frecuencia de administración es en dosis única de tratamiento.

Vía de administración: Vía oral

Modo de empleo:

Se debe administrar la cantidad necesaria de comprimidos, de acuerdo al peso del animal, en una sola toma y en conjunto o posterior a la comida. Para facilitar su administración los comprimidos cuentan con un recubrimiento sabor a carne.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

Ante la ausencia de estudios específicos, no se recomienda su uso en gatos severamente debilitados ni con grave disfunción hepática o renal.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en gatitos menores a 6 semanas de edad.

No administrar en gatitos o gatos con un peso menos a 0,5 kg.

No administrar a animales hipersensibles a Milbemicina oxima o Praziquantel.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

En muy raras ocasiones (y en especial en gatos jóvenes), signos de tipo sistémicos (como: letargia), neurológicos (como: temblor muscular y ataxia) y/o gastrointestinales (como: vómitos y diarrea), podrían observarse posterior a la administración del producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

En caso de utilizar 1/2 comprimido, mantener la otra mitad dentro de su envase original, a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C), hasta su próximo uso y por un periodo máximo de 6 meses.

PRESENTACION

Estuche con 1 blíster conteniendo 2 comprimidos.

Venta Bajo Receta Medico Veterinaria.

USO VETERINARIO

FT0176NAC02052024R1V2

Fabricado en Francia por Virbac S.A.
1ère avenue 2065 m LID, O6510 (Carros – Francia).

Importado y distribuido en Chile por:
Centrovet Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos – Santiago.
www.virbac.cl
Bajo licencia de Virbac S.A., Francia.

