

# VIRBAC RILEXINE® 300

Cefalexina 300 mg

Antibióticos – Comprimidos Orales



REG. SAG N° 1535 - B

## COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Cefalexina monohidrato 315,52 mg

(Equivalente a Cefalexina anhidra 300 mg)

Excipientes c.s.p. 720,00 mg

## ESPECIES DE DESTINO

Perros.

## INDICACIONES DE USO

Tratamiento de infecciones cutáneas, urinarias, respiratorias, gastrointestinales e infecciones óseas en perros, producidas por microorganismos sensibles a Cefalexina, como son:

**Infecciones cutáneas:** Piodermas superficiales y profundas, causadas por *Staphylococcus* spp., *Escherichia coli* y *Proteus* spp.

**Infecciones urinarias:** Nefritis y Cistitis causadas por *Staphylococcus* spp., *Proteus* spp., *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., y *Streptococcus* spp.

**Infecciones respiratorias:** Neumonías causadas por *Escherichia coli*, *Streptococcus* spp., *Klebsiella* spp., y *Staphylococcus* spp.

**Infecciones gastrointestinales:** Causadas por *Escherichia coli*, *Proteus* spp., y *Klebsiella* spp.

**Infecciones óseas:** Osteítis causadas por *Escherichia coli*.

## DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

### Dosificación:

15 mg de Cefalexina anhidra/kg de peso corporal, cada 12 horas, durante 5 - 7 días consecutivos, equivalente a ½ comprimido de Virbac Rilexine® 300 cada 10 kg de peso corporal, cada 12 horas, durante 5 - 7 días consecutivos.

Vía de administración: Vía oral.

### Modo de empleo:

Administrar conjuntamente con el alimento.

Asegurarse de que el animal degluta el comprimido.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

### Mantener fuera del alcance de los niños.

De acuerdo a las buenas prácticas de uso, se recomienda administrar el producto basado en pruebas de susceptibilidad.

Precaución frente al uso conjunto con Aminoglucósidos, diuréticos potentes (ej. Furosemida), u otras sustancias nefrotóxicas. Utilizar con precaución en pacientes con antecedentes de enfermedades renales, por el efecto nefrotóxico de las Cefalosporinas.

## CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a las Cefalosporinas.

No administrar a animales deshidratados, con vómitos o diarrea, antes de corregir esta condición.

No utilizar en hembras preñadas ni durante la lactancia.

No utilizar en animales reproductores.

## EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

En raras ocasiones pueden producirse vómitos, que pueden ser evitados administrando el producto conjuntamente con los alimentos.

En casos muy raros (<1/10000), las reacciones de hipersensibilidad, que son principalmente leves, pueden ocurrir en animales alérgicos al ingrediente activo.

Si estos efectos o reacciones adversas ocurren, consulte a un Médico Veterinario para adaptar la terapia antibiótica.

No existe antídoto específico. En caso de sobredosis, administrar terapia sintomática y de soporte, y de ser posible, realizar un lavado gástrico, todo esto, bajo supervisión de un Médico Veterinario.



### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

### PRESENTACIÓN

Estuche de cartón impreso, con 2 blíster de aluminio, conteniendo 7 comprimidos cada uno.

**Venta bajo Receta Médico Veterinaria.**

### USO VETERINARIO

FT0183NAC16022022R1V1

