

YODOCAP® 10%

Antiséptico – Uso Externo

REG. SAG N° 62

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contienen:

Povidona yodada 10 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, caballos, cerdos, ovinos, caprinos, perros y gatos.

INDICACIONES DE USO

Para tratamiento antiséptico de piel, mucosas, heridas y campo quirúrgico.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

Para tratamiento antiséptico de piel, mucosas, heridas y campo quirúrgico, utilizar el producto sin diluir. Para antisepsia pre y post parto, diluir al 50%. Una sola aplicación tiene una actividad residual de 4 a 6 horas.

Vía de administración: Vía Tópica.

Modo de empleo:

Depilar el área a tratar. Lavar con agua y jabón y secar. Aplicar con gasa o apósito en una sola dirección, y dejar secar.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

La materia orgánica (ej: sangre) puede disminuir la eficacia germicida del activo, por tanto, es recomendable lavar la piel y heridas previo a su uso.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en animales con antecedentes de hipersensibilidad al Yodo.

No utilizar en cavidad peritoneal.

No utilizar en heridas abiertas y de gran extensión.

No utilizar en heridas profundas.

No utilizar en caso de quemaduras.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

Se puede presentar irritación de piel y mucosas, especialmente en animales con hipersensibilidad al Yodo, síntomas que disminuyen cuando se suspende el tratamiento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERÍODO DE RESGUARDO

Cero días.

PRESENTACIÓN

Envases de 500 mL, 1 y 5 L.

Venta Libre.

USO VETERINARIO



Antiséptico

FT0188NAC14042022R1V1

