

ZANIL® HCL 80%

Oxitetraciclina clorhidrato 80%
Antibióticos - Polvo Oral

Reg. SAG N° 1863-B

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:
Oxitetraciclina clorhidrato 80 g
(Equivalente a 74,2 g de Oxitetraciclina base)
Excipientes c.s.p. 100 g

ESPECIES DE DESTINO

Aves (Pollos broiler) y Cerdos.

INDICACIONES DE USO

En todas las especies de destino, como tratamiento de infecciones producidas por gérmenes sensibles:

Aves: Cólera Aviar (por *Pasteurella multocida*), Enfermedad Crónica Respiratoria (por *Mycoplasma gallisepticum* y *Escherichia coli*), Coriza Infecciosa (por *Avibacterium paragallinarum*), Salmonelosis.

Cerdos: Cuadros diarreicos (por *Escherichia coli* y *Salmonella choleraesuis*), cuadros neumónicos (por *Pasteurella multocida*), Salmonelosis, Leptospirosis.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

Aves: 20 - 59 mg de Oxitetraciclina base/kg peso vivo/día (equivalente a 27 - 80 mg de Zanyl® HCL 80%/kg peso vivo), por 7 a 14 días.

Cerdos: 20 - 25 mg de Oxitetraciclina base/kg peso vivo/día (equivalente a 27 - 34 mg de Zanyl® HCL 80%/kg peso vivo), por 5 a 7 días.

Vía de administración: Vía oral, en el agua de bebida.

ADVERTENCIAS, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIÓN CON OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Mantener fuera del alcance de los niños.

- No usar en animales con insuficiencia renal o hepática.
- No usar en animales con hipersensibilidad conocida al activo.
- No administrar en aves productoras de huevos para consumo humano.
- No administrar en hembras gestantes o en lactancia.
- No usar en conjunto con antibióticos bactericidas.
- No administrar con cationes polivalentes (sales de calcio, leche y productos lácteos).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Aves (Pollos broiler): 5 días.
Cerdos: 10 días.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Frascos 1 kg y bolsas de 1 y 10 kg.

