



BACTKILLER® 5%

Doxiciclina 5%

Antibióticos – Solución Inyectable

REG. SAG N° 2439 - B

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contienen:

Doxiciclina hclato 5,77 g

(Equivalente a 5 g de Doxiciclina base)

Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Salmónidos.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento y control de cuadros infecciosos bacterianos asociados a *Vibrio ordalii*, *Vibrio anguillarum*, *Flavobacterium psychrophilum*, *Aeromonas salmonicida* atípica, *Renibacterium salmoninarum*, *Piscirickettsia salmonis* y *Yersinia ruckeri*.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

Dosis única de 25 mg de Doxiciclina base/kg de peso vivo (equivalente a 0,5 mL de Bactkiller® 5%/kg de peso vivo).

Vía de administración: Vía intraperitoneal.

Modo de empleo:

-Agitar bien antes y durante su uso.

-Administrar en forma aséptica.

-Anestesiarse los peces previa inyección.

-Utilizar agujas y jeringas estériles, adecuadas al tamaño de los peces a tratar.

-La inyección se debe realizar por vía intraperitoneal, en la línea media, a una distancia de 1 a 1½ de la aleta pélvica.

-Aplicar el producto inyectando una vez la dosis recomendada de 25 mg de Doxiciclina base/kg de peso vivo (0,5 mL de Bactkiller® 5%/kg de peso vivo).

-Una vez tratados, devolver los peces al agua, para su recuperación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

De acuerdo a las buenas prácticas de uso, el producto se debe administrar basado en pruebas de susceptibilidad.

Utilizar inmediatamente una vez abierto el envase y descartar el producto sobrante.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida al principio activo.

No administrar en animales reproductores.

EECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

No descritos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: a no más de 25 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar. No refrigerar ni congelar.

PERIODO DE RESGUARDO

1.020 grados días.

PRESENTACIONES

Frascos de 100 y 250 mL.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO



Antibióticos

FT0097NAC21122023R3V2

