



VETERIN® 10%

Florfenicol 10%

Antibióticos – Solución Inyectable

REG. SAG N° 2364

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contienen:

Florfenicol

10 g

Excipientes c.s.p.

100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Salmónidos.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento y control de la infección bacteriana por *Piscirickettsia salmonis* en salmónidos.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

Dosis única de 20 mg de Florfenicol/kg p.v. (equivalente a 0,2 mL de Veterin® 10% S.I./kg p.v.).

Vía de administración: Vía intraperitoneal.

Modo de empleo:

-Agitar bien antes y durante su uso.

-Administrar en forma aséptica.

-Anestesiarse los peces previa inyección.

-Utilizar agujas y jeringas estériles, adecuadas al tamaño de los peces a tratar.

-La inyección se debe realizar por vía intraperitoneal, en la línea media, a una distancia de 1 a 1½ de la aleta pélvica.

-Aplicar el producto inyectando una vez la dosis recomendada de 20 mg de Florfenicol/kg de peso vivo (0,2 mL de Veterin® 10% S.I./kg p.v.).

-Una vez tratados, devolver los peces al agua, para su recuperación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

De acuerdo a las buenas prácticas de uso, se recomienda administrar el producto basado en pruebas de susceptibilidad.

Utilizar inmediatamente una vez abierto el envase y descartar el producto sobrante.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida al principio activo.

No administrar en animales reproductores.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

No descritos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: a no más de 25 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar. No refrigerar ni congelar.

PERIODO DE RESGUARDO

222 grados días.

PRESENTACIONES

Envases de 100 mL y 250 mL.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO



Antibióticos

FT0191NAC26122023R2V1